

なし

◎黒星病対策として
収穫後の防除も徹底しましょう！

《黒斑・黒星病防除》 (収穫終了後)

- ・1回目 10月15日頃 オーソサイド(水) 600倍
- ・2回目 10月31日頃 オーソサイド(水) 600倍
- ・3回目 11月8日頃 ベフラン(液) 1,000倍

《礼肥》 (収穫終了後)

- ・ニトランダ(20kg) (N-15.5・Ca-26) 10a/1袋

《元肥》 (10月中旬)

- ・旬の素(ボカシ)(20kg) (N-5・P-7・K-3) 10a/3袋

- ・アミノ酸有機特30号(20kg) (N-10・P-10・K-10) 10a/7袋

又は

- ・アミノ酸BB(バルクブレンド)肥料 (N-14・P-6・K-6) (20kg) 10a/5袋

◎収穫後のサビ病防除をしましょう！

ぶどう

【9月上旬】

- ・アビオンE 1,000倍
- ・Zボルドー(水) 500倍 (一/一)
- ・クレフノン 100倍

◎樹勢維持の為に礼肥は、必ず施用しましょう。

(1トン当りのチッソ吸収量:成分で6kg)

【9月下旬】

- ・アミノ酸有機特30号(20kg) (N-10・P-10・K-10) 10a/1袋

いちご

《定植時》

- ・育王(核酸)1,000倍⇒根部浸漬し、定植する。

【アブラムシ類】

- ・モスピラン粒(定植時1回)⇒植穴土壌混和する。(1穴1g)

【炭そ病】

- ・アミスター20F 2,000倍 (前日/3回)
- ・ファンベル顆粒 1,000倍 (前日/3回)
- ・ファンタジスタ顆粒 2,000倍 (前日/3回)

【じゃのめ病】

- ・トリフミン(水) 3,000倍 (前日/5回)

おうとう

◎次年度の花芽充実の為に
元肥をしっかり施用しましょう。

《元肥》

- ・旬の素(ボカシ)(20kg) 10a/5袋
(N-5・P-7・K-3)
- ・硫酸マグネシウム(水溶性苦土)(20kg) 10a/3袋
(Mg-25)
- ・スーパーリンリン(20kg) 10a/2袋
(P-20・N-2・K-2・Mg-2)

きゅうり

《褐斑病・灰カビ病》

- ・ゲッター(水) 1,500倍 (前日/5回)
- ・ファンベル顆粒 1,000倍 (前日/3回)
- ・パレード20フロアブル 2,000倍 (前日/3回)

《炭そ病》

- ・ゲッター(水) 1,500倍 (前日/5回)
- ・トップジンM(水) 1,500倍 (前日/5回)
- ・オーソサイド(水) 600倍 (前日/5回)

《ウリノメイガ・アザミウマ》

- ・グレーシア乳剤 2,000倍 (前日/2回)
- ・フェニックス顆粒 2,000倍 (前日/3回)
- ・プレバソンフロアブル 2,000倍 (前日/3回)
- ・スピノエース顆粒 5,000倍 (前日/2回)

《ハダニ》

- ・スターマイトフロアブル 2,000倍 (前日/1回)
- ・カネマイトフロアブル 1,000倍 (前日/1回)
- ・ダブルフェースフロアブル 2,000倍 (前日/1回)

にら

◎長雨・低温が続きました。
病害予防と樹勢維持に努めましょう！

◎すて刈り直後の病害予防・樹勢維持に！

*坪当り6L灌注

- ・トップジンM(水) (1回/21日前) 1,000倍
- ・育王(核酸) 1,000倍
- ・アミノ酸有機液肥064号(N-10・P-6・K-4) 500倍

《白斑葉枯病》

- ・アミスター20F (14日前/2回) 2,000倍
- ・セイビアF (7日前/1回) 2,000倍
- ・ファンタジスタ顆粒(水)(前日/3回) 3,000倍

反射シート

*アルミ製反射シート

規格:1.5x50m ¥8,608

規格:1.8x50m ¥10,219



シャインホワイト

*反射率90%以上の生地

規格:1.5x100m ¥21,780

規格:2.0x100m ¥29,040

ゴアテックスBloom

*ジャケット・パンツ set

¥39,930

