

新規作用性 殺虫剤

アベンジャー フロアブル

アザミウマ類に特効的・
サビダニ類にも高い効果

併せて、タバココナジラミ類、小型のチョウ目害虫にも有効


新規作用機作で既存剤に
感受性の低下した害虫に有効

ミトコンドリア電子伝達系複合体III Qiを阻害する

天敵・有用昆虫に
対する影響が小さい

ミツバチ・マルハナバチ・カブリダニ類等に対して影響が小さい

極めて高い速効性・
優れた残効性



アベンジャーは三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の登録商標です。



適用作物
拡大中!!



三井化学クロップ&ライフ
ソリューション株式会社



有効成分 : フロメトキン 10.0%
 その他成分 : 水、界面活性剤等 90.0%
 性状 : 類白色水和性粘稠懸濁液体
 毒性 : 医薬用外劇物

適用害虫の範囲及び使用方法

※ シルバーリーフコナジラミを含む

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロメトキンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アザミウマ類 ミカンサビダニ チャノホコリダニ	2000~4000倍	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
マンゴー	アザミウマ類	2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
なす、ビーマン しとう	タバココナジラミ類	1000倍			2回以内		2回以内
しょくようほおづき バジル、にんにく	アザミウマ類	2000倍			3回以内		3回以内
トマト ミニトマト	アザミウマ類 タバココナジラミ類	1000~2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
	トマトサビダニ	1000~4000倍			2回以内		2回以内
すいか、いちご	アザミウマ類	1000~2000倍			3回以内		3回以内
はくさい	アオムシ	1000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
	コナガ	1000~2000倍			3回以内		3回以内
キャベツ	コナガ アザミウマ類	1000倍			2回以内		2回以内
きく(葉) なら、食用ざく	アオムシ	1000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
しそ	アザミウマ類	2000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
しそ(花穂)	アオムシ アザミウマ類	1000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
プロッコリー カリフラワー	コナガ	1000~2000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
だいこん	アザミウマ類	1000~2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
ねぎ	アザミウマ類 ネギハモグリバエ	2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
わけぎ あさつき	アザミウマ類 ネギハモグリバエ	2000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
たまねぎ	アザミウマ類	1000~2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
ほうれんそう	アスパラガス	2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
みょうが(花穂)	タバココナジラミ類	100~800ℓ/10a		3回以内	3回以内		3回以内
みょうが(茎葉)	アザミウマ類	1000倍	100~300ℓ/10a	3回以内	3回以内		3回以内
茶	チャノホソガ チャノキイロアザミウマ	2000~4000倍 1000~4000倍	200~400ℓ/10a	摘採14日前まで	2回以内	散布	2回以内
きく ほおづき	アザミウマ類	2000倍	100~300ℓ/10a	発生初期			2回以内
グロリオサ		1000倍					

使い方のポイント ●散布ムラがないように散布してください。 ●抵抗性の発達を抑えるため、連用はさせてください。 ●使用する前に容器を良く振ってください。

適用害虫の一例



ミナミキイロアザミウマ



ミカンキイロアザミウマ



ネギアザミウマ



チャノキイロアザミウマ



トマトサビダニ



ミカンサビダニ



コナガ



チャノホソガ



タバココナジラミ

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届くところには置かないでください。● 空容器は圃場等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。● 防除日誌に記帳しましょう。

お問い合わせ / ご注文は



三井化学クロップ＆ライフ
ソリューション株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1日本橋ダイヤビルディング
ナビダイヤル 0570-077557 (平日9:00~17:00 祝祭日除く)

