

なし

◎黒星病の重要防除時期になります。梅雨明けまで7～10日雨前間隔の散布を心がけましょう。

【6月20日頃】

- ・アビオンE 1,000倍
- ・キャプレート(水) 600倍 (7日前/4回)
- ・ダントツ(水溶) 2,000倍 (前日/3回)

●ダニ対策として

- ・ニツソラン(水) 2,000倍 (7日前/1回) を使用

《葉面散布剤》

- ・ネオカル 1,000倍 (カルシウム)

*青ナシ防除として

- キャプレート(水)にかえて
- ・ロブドー(水) 600倍(14日前/5回) を使用する。

【6月30日頃】

- ・アビオンE 1,000倍
- ・ベルコート(水) 1,000倍 (14日前/5回)
- ・ダースバンDF 3,000倍 (30日前/3回)
- ・カネマイトフロアブル 1,000倍 (前日/1回)

- ・ネオカル 1,000倍 (カルシウム)

【黒星病対策 特別散布】

- 6/20～7/10の期間で黒星病が多発する場合は
- ・ユニックス顆粒 2,000倍(21日前/3回)を散布する

【7月10日頃】

- ・アビオンE 1,000倍
- ・キャプレート(水) 600倍 (7日前/4回)
- ・バリアード顆粒(水) 2,000倍 (前日/3回)

- ・ネオカル 1,000倍 (カルシウム)

*青ナシ防除として

- キャプレート(水)にかえて
- ・キノンドー顆粒(水) 1,000倍(3日前/9回) を使用する

ぶとう

◎灰色カビ病・べと病・アザミウマに注意し、花粉溶脱の恐れがあるので、展着剤を使用しない

【落花直後】

- ・スイッチ顆粒(水) 2,000倍 (30日前/2回)
- ・ジマンダイセン(水) 1,000倍 (45日前/2回)
- ・コテツフロアブル 2,000倍 (60日前/2回)

《葉面散布剤》

- ・トルキヤップα 1,000倍 (葉面散布肥料)

【特別散布】

- ・ベトファイター顆粒 3,000倍 (30日前/3回)
- ・マグリキ(苦土) 1,000倍

【6月下旬頃】 *今回、又は次回散布後速やかに袋掛けする

- ・アトマイヤーフロアブル 5,000倍 (21日前/2回)
- ・ファンタジスタ顆粒(水) 3,000倍 (14日前/3回)
- ・マグリキ 1,000倍 (苦土)

きゅうり

《べと病》

- ・ホライズンDF 2,500倍 (前日/3回)
- ・ベトファイター 2,000倍 (前日/3回)
- ・ゾーベックエニベル(顆粒) 750倍 (前日/2回)

《黒星病》

- ・スコア顆粒(水) 2,000倍 (前日/3回)
- ・トップジンM(水) 1,500倍 (前日/5回)
- ・ファンベル(顆粒) 1,000倍 (前日/3回)

《灰色カビ病・菌核病》

- ・パレード20フロアブル 2,000倍 (前日/3回)
- ・ファンタジスタ(顆粒) 2,000倍 (前日/3回)

《アザミウマ》

- ・ディアナSC 2,500倍 (前日/2回)
- ・モベントフロアブル 2,000倍 (前日/3回)
- ・グレーシア(乳) 2,000倍 (前日/2回)

《ウリノメイガ》

- ・グレーシア(乳) 2,000倍 (前日/2回)
- ・ヨーバルフロアブル 5,000倍 (前日/3回)

《アブラムシ》

- ・トランスフォームフロアブル 2,000倍 (前日/2回)
- ・コルト(顆粒) 4,000倍 (前日/3回)

*曲がり果の軽減・側枝の充実

- ・ファイト・オーツ 1,000倍(定植から主枝ピンチまで3～4回)

*樹勢維持・回復に

- ・スーパーグロス 1,000倍と
マグリキ 1,000倍

*光・温度ストレス下での品質低下防止、収量増加

- ・リダバイタル 1,000倍

かき

◎落葉病・アザミウマに注意しましょう。

【6月13～15日頃】(落花直後)

- ・ジマンダイセン(水) 600倍 (45日前/2回)
- ・モスピラン顆粒(水) 2,000倍 (前日/3回)

《葉面散布剤》

- ・スーパーグロス 1,000倍 (葉面散布肥料)

【6月25～30日頃】

- ・アビオンE 1,000倍
- ・キノンドー顆粒(水) 1,000倍 (14日前/5回)
- ・アグロスリン(水) 1,000倍 (前日/3回)

- ・スーパーグロス 1,000倍 (葉面散布肥料)